

**OSTRUZIONE PARZIALE:** IL LATTANTE TOSSISCE - PIANGE - EMETTE SUONI  
INCORAGGIA LA TOSSE - NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA

**OSTRUZIONE COMPLETA:** IL LATTANTE NON TOSSISCE - NON PIANGE - NON EMETTE SUONI  
ESEGUIRE SUBITO LE MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE

## LATTANTE 1-12 MESI



**1**  
CHIEDI AIUTO SENZA  
ABBANDONARE IL BIMBO



**2**  
AFFERRA LA MANDIBOLA  
DEL BIMBO




**3**  
ALTERNA 5 PACCHE INFRASCAPOLARI SU PIANO DECLIVE  
A 5 COMPRESSIONI TORACICHE A 2 DITA



**4**  
QUANDO IL BIMBO DIVENTA  
INCOSCIENTE POSIZIONALO  
SU PIANO RIGIDO



**5**  
CHIAMA SUBITO IL 112  
(TELEFONO IN VIVA VOCE)



**6**  
MANTIENI IL CAPO  
IN POSIZIONE NEUTRA



**7**  
GUARDA IN BOCCA, RIMUOVI  
IL CORPO ESTRANEO SOLO SE  
AFFIORA [1 SOLO TENTATIVO]




**8**  
ESEGUI 5 VENTILAZIONI  
BOCCA - BOCCA / NASO



**9**  
ESEGUI 30 (o 15) COMPRESSIONI  
TORACICHE CON 2 DITA



**10**  
CONTROLLA IN BOCCA ED ESEGUI  
2 INSUFFLAZIONI: BOCCA - BOCCA  
/ NASO, RIMUOVI IL CORPO  
ESTRANEO SOLO SE AFFIORA



**11**  
CONTINUA ALTERNANDO  
30 (o 15) COMPRESSIONI  
A 2 DITA A 2 INSUFFLAZIONI  
BOCCA - BOCCA / NASO.  
RICORDATI DI CONTROLLARE  
SEMPRE IN BOCCA.  
PROSEGUI ALTERNANDO  
COMPRESSIONI E INSUFFLAZIONI  
FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI



www.cri.it

www.critrentino.it

mssp@critrentino.it

PER INFO MANOVRE  
SALVAVITA PEDIATRICHE:

Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Trento



Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Trento

"UN TUO SEMPLICE GESTO...  
PER IL SORRISO  
DI UN BIMBO"

ISTRUTTORI M.S.P.



TRENTINO

Responsabile Progetto: Inf. Marika Bort  
Responsabile Scientifico: dott.ssa Margherita Taras  
Delegato Regionale Area Salute: dott. Francesco Mattedi

# OSTRUZIONE PARZIALE: IL BAMBINO TOSSISCE - PARLA - PIANGE INCORAGGIA LA TOSSE - NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA

## OSTRUZIONE COMPLETA: IL BAMBINO NON TOSSISCE - NON PARLA - NON PIANGE ESEGUIRE SUBITO LE MANOVRE PER LA DISOSTRUZIONE BAMBINO OLTRE 1 ANNO

 <p><b>1</b> CHIEDI AIUTO SENZA ABBANDONARE IL BAMBINO</p>	 <p><b>2</b> AFFERRA LA MANDIBOLA DEL BAMBINO</p>	 <p><b>3</b> POSIZIONA IL BAMBINO SU UN PIANO DECLIVE</p>	 <p><b>4</b> ALTERNA 5 PACCHE INFRASCAPOLARI A 5 COMPRESSIONI ADDOMINALI (manovra di Heimlich)</p>	
 <p><b>5</b> QUANDO IL BAMBINO DIVENTA INCOSCIENTE POSIZIONALO SU PIANO RIGIDO</p>	 <p><b>6</b> CHIAMA SUBITO IL 112 (TELEFONO IN VIVA VOCE)</p>	 <p><b>7</b> MODERATA ESTENSIONE DEL CAPO, CONTROLLA IN BOCCA, RIMUOVI IL CORPO ESTRANEO SOLO SE AFFIORA</p>	 <p><b>8</b> 5 INSUFFLAZIONI BOCCA A BOCCA PINZANDO IL NASO</p>	 <p><b>9</b> ESEGUI 30 (o 15) COMPRESSIONI TORACICHE AD UNA MANO</p>

**10**  
CONTROLLA  
IN BOCCA ED ESEGUI  
2 INSUFFLAZIONI  
BOCCA A BOCCA  
PINZANDO IL NASO

**11**  
CONTINUA  
AD ALTERNARE  
30 (O 15)  
COMPRESSIONI  
A 2 INSUFFLAZIONI

**ESEGUI SUBITO LE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE,  
SE NON SONO EFFICACI, RICORDA:**

- MANTIENI IL CAPO IN POSIZIONE NEUTRA NEL LATTANTE
- MANTIENI IL CAPO IN MODERATA ESTENSIONE NEL BAMBINO
- RICORDA DI CONTROLLARE IN BOCCA PRIMA DI OGNI VENTILAZIONE
- RIPOSIZIONA IL CAPO SE NECESSARIO E INSUFFLA CON PIÙ FORZA
- PROSEGUI ALTERNANDO COMPRESSIONI E INSUFFLAZIONI FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI.

(SECONDO LE LINEE GUIDA IRC/ERC 2021)